

17.18. Convulsiones. Epilepsia

Las **convulsiones** son movimientos bruscos y generalizados de brazos y piernas, normalmente acompañados de pérdida de conocimiento. Sin embargo, en los niños las convulsiones pueden ser menos aparatosas.

También es importante tener en cuenta que **la mayoría de los «ataques» que se producen en estas edades no son epilepsia**. Los más frecuentes son producidos por la fiebre, pero también pueden aparecer con las situaciones de angustia o tensión emocional, debidas a ansiedad o dolor, o incluso como consecuencia de pesadillas.

Si su hijo ha tenido ataques repetidos y los médicos le han confirmado que tiene una **epilepsia** debe saber que:

- La epilepsia se debe a descargas eléctricas anormales en el cerebro que producen crisis o ataques que aparecen de repente y duran poco tiempo.
- En la mayoría de los casos no se encuentra la causa. No es una enfermedad contagiosa ni va a causar retraso mental a su hijo. Tampoco es una enfermedad mental.
- Puede iniciarse a cualquier edad y afecta igual a hombres y mujeres. Su hijo es igual al resto de niños, sólo en algunas ocasiones puede tener algún problema de rendimiento escolar.

¿Qué puede hacer?

- Asegúrese de que toma regularmente la medicación. La mayoría de casos se controlan bien con el tratamiento. Guárdela bien y tenga suficiente en casa para no quedarse sin medicación en un momento dado. Debe conocer bien los medicamentos que toma el niño, el nombre y la cantidad.
- No suspenda o interrumpa la medicación por su cuenta. Puede ser que no necesite el tratamiento toda la vida, pero en cualquier caso su médico le dirá cuándo se puede dejar.
- Evite los videojuegos, las luces de discoteca, el ordenador, la televisión, etc. si en algún momento **han producido o desencadenado un ataque** en su hijo.
- Procure que lleve una vida lo más normal posible. Si está bien controlado podrá hacer deporte. Debe usar casco cuando vaya en bicicleta y siempre le debe acompañar un amigo o un adulto cuando nade. Debe evitar los deportes de riesgo como el buceo o la escalada.
- Se aconseja: evitar las literas; ducharse mejor que bañarse, poner barandillas en los baños y colocar en los baños puertas que se abran hacia afuera (para no bloquear la entrada de ayuda en caso de crisis).

SI SU HIJO TIENE UN ATAQUE

- Permanezca calmado. Quédese a su lado hasta que se le pase. Normalmente suele durar menos de 3 minutos. Si dura más de 5 minutos, acuda al servicio de urgencias. Si su médico le ha indicado darle una medicación, adminístresela.



- Retire los objetos que se encuentren cerca, afloje la ropa apretada y proteja su cabeza colocándole un objeto suave debajo.
- No le ponga ningún objeto en su boca. Podría lastimarlo o bien sufrir una mordedura. Túmbelo boca abajo y la cabeza de lado, para que puedan salir las salivas o el vómito y pueda respirar.
- No se requiere de la presencia inmediata de un médico. Solamente en caso de que la convulsión dure más de 5 a 10 minutos, o si el paciente tiene una convulsión seguida de otra.
- Una vez finalizado el ataque, deje que descanse o duerma. Le ayudará a recuperarse.
- Acuda a su médico. Después de una convulsión, es necesario que el niño sea visto por su médico para informarle sobre la crisis.

¿Cuándo pedir ayuda o acudir a un centro sanitario?

- Si es la primera crisis que ha tenido en su vida.
- Si se ha herido durante la crisis o se ha golpeado la cabeza.
- Si la crisis dura más de 5 minutos o tiene una duración muy superior a las habituales.
- Si tiene fiebre.
- Si al niño no le sienta bien la medicación, y siempre que tenga dudas o se encuentre desorientado.

¿Dónde conseguir más información?

- <http://www.aepap.org/faqpad/faqpad-epilepsia.htm>