

## CALENDARIOS ACELERADOS PARA NIÑOS CON INMUNIZACIONES RETARDADAS

### Programa de Vacunaciones de Andalucía 2.004

#### Niños entre 4 meses y 6 años

Dosis 1 (Edad mínima)	Intervalo mínimo entre dosis			
	Dosis 1 a dosis 2	Dosis 2 a dosis 3	Dosis 3 a dosis 4	Dosis 4 a dosis 5
<b>DTPa</b> (6 semanas)	<b>4 semanas</b>	<b>4 semanas</b>	<b>6 meses</b>	<b>6 meses<sup>1</sup></b>
<b>VPI</b> (6 semanas)	<b>4 semanas</b>	<b>4 semanas</b>	<b>4 semanas</b>	
<b>HB</b> (nacimiento)	<b>4 semanas</b>	<b>8 semanas</b> (y 16 semanas tras 1ª dosis)		
<b>Triple vírica</b> (12 meses)	<b>4 semanas<sup>2</sup></b>			
<b>Hib<sup>3</sup></b> (6 semanas)	<b>4 sem.:</b> Si 1ª dosis <12 meses. <b>8 sem. (dosis final)</b> Si 1ª dosis 12-14 m. <b>No es necesario más dosis:</b> Si 1ª dosis ≥ 15 meses	<b>4 sem.:</b> Si edad actual <12 meses. <b>8 sem. (dosis final)</b> Si edad actual ≥ 12 m. Y 2ª dosis administrada <15 m. <b>No es necesario más dosis:</b> Si dosis previa ≥ 15 meses	<b>8 semanas (dosis final):</b> solamente cuando el niño tiene entre 12 meses-5 años y recibió 3 dosis antes de los 12 meses	
<b>Men C</b> (8 semanas)	<b>4 sem.:</b> Si 1ª dosis <6 meses. <b>4 sem. (dosis final)</b> Si 1ª dosis entre 6-12 meses. <b>No es necesario más dosis:</b> Si 1ª dosis ≥ 12 meses	<b>4 sem.:</b> Sólo es necesaria si la 1ª dosis se administró <6 meses		

## Niños entre 7-18 años

Intervalo Mínimo Entre Dosis		
Dosis 1 a dosis 2	Dosis 2 a dosis 3	Dosis 3 a dosis recuerdo
<b>Td:</b> 4 semanas	<b>Td:</b> 6 meses	<b>Td<sup>4</sup></b> <b>6 meses:</b> Sí 1ª dosis < 12 m. y edad actual < 11 años. <b>5 años:</b> Sí 1ª dosis ≥ 12 m. y 3ª dosis < 7 años y edad actual ≥ 11 años. <b>10 años:</b> Sí 3ª dosis ≥ 7 años
<b>Polio:</b> 4 semanas	<b>4 semanas</b>	<b>4 semanas</b>
<b>HepB:</b> 4 semanas	<b>8 semanas</b> (y 16 semanas tras 1ª dosis)	
<b>Triple vírica:</b> 4 semanas		

1. **DTP(a):** La 5ª dosis no es necesaria si la 4ª dosis se administró después del 4º aniversario.
2. **Triple vírica:** La 2ª dosis de triple vírica se a los 3 años o a partir de esta edad.
3. **Hib:** Esta vacuna no se recomienda habitualmente para niños ≥ 5 años.
4. **Td:** A partir de 6 meses si la 3ª dosis se ha recibido con menos de 7 años y la edad actual está entre 7 y 10 años. A los 5 años si la tercera dosis fue recibida con menos de 7 años y la edad actual es ≥ 11 años. A los 10 años si la 3ª dosis se recibió con 7 años o más.